

**Oceňovacie tabuľky pre poistenie trvalých následkov úrazu
dosahujúcich najmenej 40 %**

| Pora- dové číslo | TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU PODĽA DRUHU A ROZSAHU | PERCENTO PLNENIA |
|---|---|---------------------|
| Úrazy hlavy a zmyslových orgánov | | |
| 1.1 | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm ² | 3 % - 15 % |
| 1.2 | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm ² | 16 % - 25 % |
| 1.3 | Subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po zraneniach hlavy dokumentované ošetrojúcim lekárom | 1 % - 10 % |
| 1.4 | Vážne mozgové poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa | 30 % - 100 % |
| 1.5 | Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa a stredného stupňa | 1 % - 10 % |
| 1.6 | Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa | 11 % - 15 % |
| 1.7 | Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa poškodenia | 3 % - 15 % |
| 1.8 | Jazvy na tvári a poškodenie tváre vzbudzujúce súcit, alebo ošklivosť sprevádzané príp. funkčnými poruchami ľahkého a stredného stupňa | 1 % - 15 % |
| 1.9 | Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť ťažkého stupňa | 16 % - 35 % |
| 1.10 | Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvororea) objektívne dokumentovaná | 5 % - 25 % |
| Poškodenie nosa alebo čuchu | | |
| 1.11 | Strata hrotu nosa | 2 % - 10 % |
| 1.12 | Strata celého nosa bez zúženia | 15 % - 20 % |
| 1.13 | Strata celého nosa so zúžením | 21 % - 25 % |
| 1.14 | Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti | 1 % - 10 % |
| 1.15 | Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení | 1 % - 10 % |
| 1.16 | Perforácia nosovej priehradky | 0,5 % - 5 % |
| 1.17 | Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín | 1 % - 10 % |
| 1.18 | Strata čuchu a chuti | 5 % - 15 % |
| Poškodenie očí alebo zraku | | |
| 1.19 | Úplná slepota oka | 25 % |
| 1.20 | Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k hodnoteniu za úplnú slepotu oka | 5 % |
| 1.21 | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne | 15 % |
| 1.22 | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne. | 20 % |
| 1.23 | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej neznašanlivosti kontaktnej šošovky | 25 % |

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| 1.24 | Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrnosť s afackickou korekciou horšia než 6/12 | 15 % |
| 1.25 | Traumatická porucha nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa | 5 % - 25 % |
| 1.26 | Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku čiastočne | 0,5 % - 4 % |
| 1.27 | Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku úplne | 4,5 % - 8 % |
| 1.28 | Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach čiastočne | 1 % - 8 % |
| 1.29 | Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach úplne | 8,5 % - 15 % |
| 1.30 | Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku | 0,5 % - 5 % |
| 1.31 | Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach | 5,5 % - 10 % |
| 1.32 | Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa | 0,5 % - 5 % |
| 1.33 | Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vizu, ktorá sa hodnotí osobitne) pre každé oko | 2 % - 5 % |
| 1.34 | Traumatická porucha akomodácie jednostranná do 45 rokov | 1 % - 5 % |
| 1.35 | Traumatická porucha akomodácie obojstranná do 45 rokov | 1 % - 8 % |
| 1.36 | Traumatická porucha akomodácie jednostranná po 45 rokoch | 1 % - 3 % |
| 1.37 | Traumatická porucha akomodácie obojstranná po 45 rokoch | 1 % - 5 % |
| 1.38 | Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný | 3 % - 10 % |
| 1.39 | Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný | 6 % - 15 % |
| 1.40 | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná | 5 % - 20 % |
| 1.41 | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná | 21 % - 60 % |
| 1.42 | Chronická uveitída (sympatická ophtalmia) po dokázateľnom úraze oka (podľa ostrosti zraku) | 10 % - 25 % |
| Poškodenie uší alebo sluchu | | |
| 1.43 | Strata jednej ušnice | 5 % - 10 % |
| 1.44 | Strata oboch ušnic | 11 % - 20 % |
| 1.45 | Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie | 0,5 % - 5 % |
| 1.46 | Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu | 3 % - 15 % |
| 1.47 | Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 1.8 a 1.9 | |
| 1.48 | Nahluchlosť jednostranná ľahkého a stredného stupňa | 1 % - 7 % |
| 1.49 | Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa | 8 % - 12 % |

| | | |
|--|--|---------------|
| 1.50 | Nahluchlosť obojstranná ľahkého a stredného stupňa | 5 % - 20 % |
| 1.51 | Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa | 21 % - 35 % |
| 1.52 | Strata sluchu jedného ucha | 15 % |
| 1.53 | Strata sluchu oboch uší | 40 % |
| 1.54 | Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa | 5 % - 20 % |
| 1.55 | Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa | 21 % - 50 % |
| Poškodenie chrupu | | |
| 1.56 | Za stratu jedného zuba | 1 % |
| 1.57 | Za stratu každého ďalšieho zuba | 1 % |
| 1.58 | Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba | 0,5 % |
| 1.59 | Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov | do 5 % |
| Poškodenie jazyka | | |
| 1.60 | Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 1.65 až 1.68 | 5 % - 15 % |
| Úraz krku | | |
| 1.61 | Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa | 5 % - 15 % |
| 1.62 | Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa | 16 % - 30 % |
| 1.63 | Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa | 31 % - 65 % |
| 1.64 | Úplná strata hrtana | 80 % |
| 1.65 | Čiastočná strata hlasu | 3 % - 20 % |
| 1.66 | Strata hlasu (afónia) | 25 % |
| 1.67 | Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov | 5 % - 20 % |
| 1.68 | Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov | 30 % |
| 1.69 | Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou | 50 % |
| Úrazy hrudníka, pľúc, srdca a pažeráka | | |
| 1.70 | Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa, bez prejavov dychovej nedostatočnosti | 0,5 % - 10 % |
| 1.71 | Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti | 10,5 % - 20 % |
| 1.72 | Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stupňa, s prajavmi dychovej nedostatočnosti | 20,5 % - 30 % |
| 1.73 | Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné | 5 % - 40 % |
| 1.74 | Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné | 20 % - 80 % |
| 1.75 | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie | 20 % - 80 % |
| 1.76 | Fistula pažeráka po úraze pokiaľ sa nedá riešiť rekonštrukciou | 20 % - 40 % |
| 1.77 | Pouúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa | 3 % - 10 % |
| 1.78 | Pouúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa | 11 % - 20 % |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| 1.79 | Pouúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa | 21 % - 60 % |
| Úrazy brucha a tráviacich orgánov | | |
| 1.80 | Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného listu | 1 % - 20 % |
| 1.81 | Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy | 5 % - 100 % |
| 1.82 | Strata sleziny - do 18. roku | 25 % |
| 1.83 | Strata sleziny - po 18. roku | 15 % |
| 1.84 | Strata časti sleziny, podľa závažnosti poruchy funkcie | do 15 % |
| 1.85 | Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí, pokiaľ sa nedá riešiť chirurgicky | 20 % - 50 % |
| 1.86 | Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná | 5 % - 20 % |
| 1.87 | Nedovieravosť análnych zvieračov úplná | 30 % - 60 % |
| 1.88 | Pouúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého alebo stredného stupňa | 3 % - 20 % |
| 1.89 | Pouúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa | 21 % - 50 % |
| Úrazy močových a pohlavných ústrojov | | |
| 1.90 | Strata jednej obličky | 40 % |
| 1.91 | Pouúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého a stredného stupňa | 5 % - 20 % |
| 1.92 | Pouúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa | 21 % - 50 % |
| 1.93 | Fistula močového mechúra alebo močovej rúry (nemožno súčasne hodnotiť podľa 1.91 a 1.92) | 10 % - 50 % |
| 1.94 | Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek | 10 % - 50 % |
| 1.95 | Hydrokéla po úraze | 0,5 % - 5 % |
| 1.96 | Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) do 45 rokov | 10 % |
| 1.97 | Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) nad 45 rokov | 5 % |
| 1.98 | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov | 35 % |
| 1.99 | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 45 rokov | 20 % |
| 1.100 | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov | 15 % - 40 % |
| 1.101 | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 45 rokov | 5 % - 20 % |
| 1.102 | Pouúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov | 15 % - 40 % |
| Úrazy chrbtovej kosti a miechy | | |
| 1.103 | Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého stupňa | 5 % - 10 % |

| | | |
|---|---|--------------|
| 1.104 | Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti stredného stupňa | 11 % - 20 % |
| 1.105 | Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ťažkého stupňa | 21 % - 35 % |
| 1.106 | Pouúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého a stredného stupňa | 10 % - 40 % |
| 1.107 | Pouúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa | 41 % - 100 % |
| 1.108 | Pouúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskeým pozorovaním | 1 % - 15 % |
| Úrazy panvy | | |
| 1.109 | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov | 10 % - 65 % |
| 1.110 | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov | 5 % - 50 % |
| 1.111 | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov | 5 % - 50 % |
| Úrazy horných končatín (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák) | | |
| 1.112 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vpravo | 60 % |
| 1.113 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vľavo | 50 % |
| 1.114 | Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo | 35 % |
| 1.115 | Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo | 30 % |
| 1.116 | Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo | 30 % |
| 1.117 | Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo | 25 % |
| 1.118 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vpravo | 0,4 % - 5 % |
| 1.119 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vľavo | 0,2 % - 4 % |
| 1.120 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vpravo | 5,5 % - 10 % |
| 1.121 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo | 4,5 % - 8 % |

| | | |
|---|---|---------------|
| 1.122 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie do 90°), vpravo | 10,5 % - 18 % |
| 1.123 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie do 90°), vľavo | 8,5 % - 15 % |
| 1.124 | Pakĺb ramennej kosti, vpravo | 40 % |
| 1.125 | Pakĺb ramennej kosti, vľavo | 35 % |
| 1.126 | Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vpravo | 30 % |
| 1.127 | Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vľavo | 25 % |
| 1.128 | Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo | 3 % |
| 1.129 | Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo | 2 % |
| 1.130 | Nenapravené akromioklavikulárne vyklíbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo | 6 % |
| 1.131 | Nenapravené akromioklavikulárne vyklíbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo | 5 % |
| 1.132 | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vpravo | 3 % |
| 1.133 | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vľavo | 2 % |
| Poškodenie v oblasti laktového kĺbu a predlaktia (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák) | | |
| 1.134 | Úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo | 30 % |
| 1.135 | Úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo | 25 % |
| 1.136 | Úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkeých (ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo | 20 % |
| 1.137 | Úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkeých (ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo | 15 % |
| 1.138 | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo | 2 % - 12 % |
| 1.139 | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo | 1 % - 10 % |
| 1.140 | Obmedzenia pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo | 13 % - 18 % |
| 1.141 | Obmedzenia pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo | 11 % - 16 % |
| 1.142 | Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkeých (v maximálnej pronácii alebo supinácii v krajnom odvrátení privrátení), vpravo | 20 % |

| | | |
|---|---|---------------|
| 1.143 | Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou prívratenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii v krajnom odvrátení prívratení), vľavo | 15 % |
| 1.144 | Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo | 1 % - 15 % |
| 1.145 | Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo | 1 % - 10 % |
| 1.146 | Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vpravo | 0,5 % - 10 % |
| 1.147 | Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vľavo | 0,3 % - 8 % |
| 1.148 | Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo | 10,5 % - 15 % |
| 1.149 | Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo | 8,5 % - 12 % |
| 1.150 | Pakľb oboch kostí predlaktia, vpravo | 40 % |
| 1.151 | Pakľb oboch kostí predlaktia, vľavo | 35 % |
| 1.152 | Pakľb vretennej kosti, vpravo | 25 % |
| 1.153 | Pakľb vretennej kosti, vľavo | 20 % |
| 1.154 | Pakľb laktovej kosti, vpravo | 15 % |
| 1.155 | Pakľb laktovej kosti, vľavo | 10 % |
| 1.156 | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vpravo | 25 % |
| 1.157 | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vľavo | 20 % |
| 1.158 | Kývavý laktový kĺb, vpravo | 5 % - 30 % |
| 1.159 | Kývavý laktový kĺb, vľavo | 3 % - 25 % |
| 1.160 | Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe, vpravo | 55 % |
| 1.161 | Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe, vľavo | 45 % |
| Strata alebo poškodenie ruky (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák) | | |
| 1.162 | Strata ruky v zápästí, vpravo | 50 % |
| 1.163 | Strata ruky v zápästí, vľavo | 45 % |
| 1.164 | Strata všetkých prstov ruky, včítane záprstných kostí vpravo | 50 % |
| 1.165 | Strata všetkých prstov ruky, včítane záprstných kostí vľavo | 45 % |
| 1.166 | Strata prstov ruky okrem palca, vpravo | 40 % |
| 1.167 | Strata prstov ruky okrem palca, vľavo | 35 % |
| 1.168 | Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dľaňové ohnutie ruky), vpravo | 30 % |

| | | |
|---|--|-------------|
| 1.169 | Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dľaňové ohnutie ruky), vľavo | 25 % |
| 1.170 | Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vpravo | 5 % - 20 % |
| 1.171 | Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vľavo | 3 % - 17 % |
| 1.172 | Pakľb člnkovitej kosti, vpravo | 15 % |
| 1.173 | Pakľb člnkovitej kosti, vľavo | 13 % |
| 1.174 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vpravo | 1 % - 12 % |
| 1.175 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vľavo | 1 % - 10 % |
| 1.176 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo | 13 % - 18 % |
| 1.177 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo | 11 % - 15 % |
| Poškodenie palca (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák) | | |
| 1.178 | Strata koncového článku palca, vpravo | 9 % |
| 1.179 | Strata koncového článku palca, vľavo | 7 % |
| 1.180 | Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo | 25 % |
| 1.181 | Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo | 20 % |
| 1.182 | Strata oboch článkov palca, vpravo | 18 % |
| 1.183 | Strata oboch článkov palca, vľavo | 15 % |
| 1.184 | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo | 8 % |
| 1.185 | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo | 6 % |
| 1.186 | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vpravo | 7 % |
| 1.187 | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení v o vystretí (v hyperextenzii), vľavo | 6 % |
| 1.188 | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo | 0,4 % - 6 % |
| 1.189 | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo | 0,3 % - 5 % |
| 1.190 | Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo | 1 % - 6 % |
| 1.191 | Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo | 0,6 % - 5 % |
| 1.192 | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo | 9 % |
| 1.193 | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo | 7 % |
| 1.194 | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo | 1 % - 6 % |
| 1.195 | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo | 0,6 % - 5 % |

| | | |
|---|---|-------------|
| 1.196 | Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo | 3 % |
| 1.197 | Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo | 2 % |
| 1.198 | Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo | 20 % |
| 1.199 | Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo | 18 % |
| 1.200 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo | 0,3 % - 4 % |
| 1.201 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo | 0,2 % - 3 % |
| 1.202 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo | 4,5 % - 6 % |
| 1.203 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo | 3,5 % - 5 % |
| 1.204 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo | 0,2 % - 4 % |
| 1.205 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo | 0,1 % - 3 % |
| 1.206 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo | 4,5 % - 6 % |
| 1.207 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo | 3,5 % - 5 % |
| 1.208 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo | 1 % - 6 % |
| 1.209 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo | 0,6 % - 5 % |
| 1.210 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo | 6,5 % - 9 % |
| 1.211 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vľavo | 5,5 % - 7 % |
| Poškodenie ukazováka (zohľadňuje sa, či je poistený pravek alebo ľavák) | | |
| 1.212 | Strata koncového článku ukazováka, vpravo | 4 % |
| 1.213 | Strata koncového článku ukazováka, vľavo | 3 % |
| 1.214 | Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo | 8 % |
| 1.215 | Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo | 6 % |
| 1.216 | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo | 12 % |
| 1.217 | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo | 10 % |
| 1.218 | Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo | 15 % |
| 1.219 | Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo | 12 % |

| | | |
|---|--|--------------|
| 1.220 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo | 10 % |
| 1.221 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo | 8 % |
| 1.222 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo | 12 % |
| 1.223 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo | 10 % |
| 1.224 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo | 0,2 % - 4 % |
| 1.225 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo | 0,1 % - 3 % |
| 1.226 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo | 4,5 % - 8 % |
| 1.227 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo | 3,5 % - 6 % |
| 1.228 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo | 8,5 % - 10 % |
| 1.229 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vľavo | 6,5 % - 8 % |
| 1.230 | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo | 2 % |
| 1.231 | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo | 1 % |
| 1.232 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo | 3 % |
| 1.233 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo | 2 % |
| Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák) | | |
| 1.234 | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo | 9 % |
| 1.235 | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo | 7 % |
| 1.236 | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo | 9 % |
| 1.237 | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo | 7 % |
| 1.238 | Strata dvoch článkov prsta, vpravo | 5 % |
| 1.239 | Strata dvoch článkov prsta, vľavo | 4 % |
| 1.240 | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo | 3 % |
| 1.241 | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo | 2 % |

| | | |
|--|--|--------------|
| 1.242 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo | 8 % |
| 1.243 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo | 6 % |
| 1.244 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo | 0,1 % - 2 % |
| 1.245 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo | 0,1 % - 1 % |
| 1.246 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo | 2,5 % - 5 % |
| 1.247 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo | 1,5 % - 4 % |
| 1.248 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo | 5,5 % - 6 % |
| 1.249 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vľavo | 4,5 % - 5 % |
| 1.250 | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo | 2 % |
| 1.251 | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo | 1 % |
| 1.252 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo | 2 % |
| 1.253 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo | 1 % |
| Traumatické poškodenia nervov hornej končatiny | | |
| 1.254 | Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vpravo | 10 % - 60 % |
| 1.255 | Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vľavo | 8 % - 50 % |
| 1.256 | Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vpravo | 5 % - 30 % |
| 1.257 | Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vľavo | 4 % - 25 % |
| 1.258 | Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vpravo | 5 % - 40 % |
| 1.259 | Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vľavo | 3 % - 30 % |
| 1.260 | Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vpravo | 5 % - 25 % |
| 1.261 | Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vľavo | 4 % - 20 % |
| 1.262 | Izolovaná porucha (lézia) nervus cutaneus brachii radialis bez mororického deficitu obojstranne | 1 % - 10 % |
| 1.263 | Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vpravo | 2 % - 15 % |
| 1.264 | Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vľavo | 1 % - 10 % |
| 1.265 | Porucha (lézia) nervus ulnaris, vpravo | 5 % - 40 % |
| 1.266 | Porucha (lézia) nervus ulnaris, vľavo | 3 % - 30 % |
| 1.267 | Porucha (lézia) nervus ulnaris len senzitivnej časti, obojstranne | 0,5 % - 10 % |
| 1.268 | Traumatická porucha stredového nervu, vpravo (nervus medianus) | 5 % - 25 % |

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1.269 | Traumatická porucha stredového nervu, vľavo (nervus medianus) | 4 % - 20 % |
| 1.270 | Porucha nervus musculocu taneus, vpravo | 3 % - 20 % |
| 1.271 | Porucha nervus musculocu taneus, vľavo | 2 % - 15 % |
| 1.272 | Porucha nervus musculocu taneus len senzitivnej časti, obojstranne | 0,5 % - 7 % |
| 1.273 | Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vpravo | 12 % - 40 % |
| 1.274 | Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vľavo | 10 % - 30 % |
| 1.275 | Lézia distálnej časti nervu radialis oblasť ruky, vpravo | 5 % - 25 % |
| 1.276 | Lézia distálnej časti nervu radialis oblasť ruky, vľavo | 4 % - 20 % |
| 1.277 | Izolovaná porucha (lézia) citlivosti nervi radialis, obojstranne | 0,5 % - 7 % |
| Úrazy dolných končatín | | |
| 1.278 | Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom | 50 % |
| 1.279 | Pakľb stehnovej kosti v krčku alebo nekroza hlavice | 40 % |
| 1.280 | Čiastočná endoprotéza bedrového kĺbu + možné hodnotiť pohyblivosť kĺbu, spolu však nesmie presiahnuť % plnenia za TEP | 8 % |
| 1.281 | Totálna endoprotézou (TEP) bedrového kĺbu | 15 % |
| 1.282 | Aktívny chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg. | 25 % |
| 1.283 | Skrátenie dolnej končatiny od 1 cm do 4 cm | do 5 % |
| 1.284 | Skrátenie dolnej končatiny do 6 cm | 5,5 % - 10 % |
| 1.285 | Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm | 10,5 % - 20 % |
| 1.286 | Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke) | 40 % |
| 1.287 | Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie) | 5 % - 30 % |
| 1.288 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého a stredného stupňa | 3 % - 15 % |
| 1.289 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa | 16 % - 25 % |
| Poškodenie kolena | | |
| 1.290 | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°) | 10 % - 30 % |
| 1.291 | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°) | 31 % - 40 % |
| 1.292 | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení | 5 % - 25 % |
| 1.293 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého a stredného stupňa | 3 % - 15 % |
| 1.294 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa | 16 % - 25 % |
| 1.295 | Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa | 3 % - 10 % |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| 1.296 | Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa | 11 % - 20 % |
| 1.297 | Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, za ktorý sa nepovažuje nákolienica | 21 % - 30 % |
| 1.298 | Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. hodnotiť. | 5 % |
| 1.299 | Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. hodnotiť. | 10 % |
| Poškodenie predkolenia | | |
| 1.300 | Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom | 45 % |
| 1.301 | Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom | 50 % |
| 1.302 | Pakľb pŕšťaly alebo oboch kostí predkolenia | 45 % |
| 1.303 | Aktívny chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach a po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg. | 20 % |
| Poškodenie v oblasti členkového kĺbu | | |
| 1.304 | Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním | 40 % |
| 1.305 | Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka | 30 % |
| 1.306 | Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním | 25 % |
| 1.307 | Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie) | 6 % - 30 % |
| 1.308 | Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení, alebo jemu blízkom | 5 % - 25 % |
| 1.309 | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa | 2 % - 12 % |
| 1.310 | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa | 13 % - 20 % |
| 1.311 | Obmedzenie pronácie a supinácie nohy | 2 % - 12 % |
| 1.312 | Kývavosť členkového kĺbu | 2 % - 12 % |
| 1.313 | Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy | 5 % - 25 % |
| 1.314 | Aktívny chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg. | 3 % - 15 % |
| Poškodenie v oblasti nohy | | |
| 1.315 | Strata všetkých prstov nohy | 18 % |
| 1.316 | Strata oboch článkov palca nohy | 10 % |
| 1.317 | Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou | 15 % |
| 1.318 | Strata koncového článku palca nohy | 3 % |
| 1.319 | Strata iného prsta nohy, za každý prst | 2 % |

| | | |
|-------|--|---------------|
| 1.320 | Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou | 10 % |
| 1.321 | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy | 3 % |
| 1.322 | Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy | 5 % |
| 1.323 | Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy | 8 % |
| 1.324 | Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy | 0,2 % - 3 % |
| 1.325 | Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy | 0,5 % - 5 % |
| 1.326 | Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst | 0,2 % - 2 % |
| 1.327 | Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine | 1 % - 10 % |
| 1.328 | Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách | 5 % - 20 % |
| 1.329 | Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne nad 2 cm v objeme | 3,1 % - 5 % |
| 1.330 | Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne nad 1 cm v objeme | 0,1 % - 3 % |
| 1.331 | Porucha (lézie) nervus glutei sup. a interior | 3 % - 15 % |
| 1.332 | Porucha nervus obturatorius | 3 % - 15 % |
| 1.333 | Senzitívna lézia nervus obturatorius | 1 % - 7 % |
| 1.334 | Poúrazová porucha nervus femoralis | 5 % - 30 % |
| 1.335 | Senzitívna lézia stehenného nervu | 1 % - 10 % |
| 1.336 | Poúrazová porucha nervus ischiadicus (sedací nerv) | 10 % - 40 % |
| 1.337 | Senzitívna lézia nervus ischiadicus | 3 % - 15 % |
| 1.338 | Nervus tibialis úplná porucha | 10 % - 30 % |
| 1.339 | Nervus tibialis distálnej časti s poruchou hybnosti prstov nohy | 0,5 % - 5 % |
| 1.340 | Senzitívna porucha nervus tibialis | 0,3 % - 5 % |
| 1.341 | Porucha kmeňa nervus fibularis s postihnutím všetkých inervovaných svalov | 10 % - 30 % |
| 1.342 | Lézia hĺbkovej vetvy ihlicového nervu | 4 % - 20 % |
| 1.343 | Lézia povrchovej vetvy ihlicového nervu (len senzitívnej časti) | 1 % - 10 % |
| Jazvy | | |
| 1.344 | Rozsiahle plošné jazvy od 1 % do 15 % telesného povrchu, okrem tváre | 0,5 % - 10 % |
| 1.345 | Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % telesného povrchu | 10,5 % - 40 % |
| 1.346 | Zvlášť zohydzujúce jazvy na exponovaných častiach tela pokiaľ nadosahujú 1% telesného povrchu, exponované časti: krk, dekolt, predlaktia v rámci laktá, ruky, predkolenia v rámci kolena, dorsum nohy. Jazvy na tvári sa hodnotia podľa bodu 1.8 | 0,1 % - 3 % |

Platné od 1.3.2017