

Oceňovacie tabuľky pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou 800 %

Číslo Trvalé následky úrazu podľa druhu a rozsahu Plnenie

Úrazy hlavy a zmyslových orgánov

1.	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm ²	3 % - 15 %
2.	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm ²	16 % - 25 %
3.	Subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po zraneniach hlavy dokumentované ošetrovujúcim lekárom	1 % - 10 %
4.	Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	30 % - 100 %
5.	Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa a stredného stupňa	1 % - 10 %
6.	Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa	11 % - 15 %
7.	Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa poškodenia	3 % - 15 %
8.	Jazvy na tvári a poškodenie tváre vzbudzujúce súcit, alebo ošklivosť sprevádzané príp. funkčnými poruchami ľahkého a stredného stupňa	1 % - 15 %
9.	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť ťažkého stupňa	16 % - 35 %
10.	Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvoro-rea) objektívne dokumentovaná	5 % - 25 %
11.	Jazva na tvári – normálna alebo hypertrofická do 1cm	0 %
12.	Jazva vo vlasatej časti hlavy	0 %

Poškodenie nosa alebo čuchu

13.	Strata hrotu nosa	2 % - 10 %
14.	Strata celého nosa bez zúženia	15 % - 20 %
15.	Strata celého nosa so zúžením	21 % - 25 %
16.	Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti	1 % - 10 %
17.	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení	1 % - 10 %
18.	Perforácia nosovej priehradky	0,5 % - 5 %
19.	Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín	1 % - 10 %
20.	Strata čuchu a chuti	5 % - 15 %

Poškodenie očí alebo zraku

21.	Úplná slepota oka	25 %
22.	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k hodnoteniu za úplnú slepotu oka	5 %
23.	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne	15 %
24.	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne.	20 %
25.	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej znášateľnosti kontaktnej šošovky	25 %

26.	Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrnosť s afakickou korekciou horšia než 6/12	15 %
27.	Traumatická porucha nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa	5 % - 25 %
28.	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku čiastočne	0,5 % - 4 %
29.	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku úplne	4,5 % - 8 %
30.	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach čiastočne	1 % - 8 %
31.	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach úplne	8,5 % - 15 %
32.	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku	0,5 % - 5 %
33.	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach	5,5 % - 10 %
34.	Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa	0,5 % - 5 %
35.	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vizu, ktorá sa hodnotí osobitne) pre každé oko	2 % - 5 %
36.	Traumatická porucha akomodácie jednostranná do 45 rokov	1 % - 5 %
37.	Traumatická porucha akomodácie obojstranná do 45 rokov	1 % - 8 %
38.	Traumatická porucha akomodácie jednostranná po 45 rokoch	1 % - 3 %
39.	Traumatická porucha akomodácie obojstranná po 45 rokoch	1 % - 5 %
40.	Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný	3 % - 10 %
41.	Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný	6 % - 15 %
42.	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná	5 % - 20 %
43.	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná	21 % - 60 %
44.	Chronická uveitída (sympatická ophtalmia) po dokázateľnom úraze oka (podľa ostrosti zraku)	10 % - 25 %

Poškodenie uší alebo sluchu

45.	Strata jednej ušnice	5 % - 10 %
46.	Strata oboch ušníc	11 % - 20 %
47.	Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	0,5 % - 5 %
48.	Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu	3 % - 15 %
49.	Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 8. a 9.	
50.	Nahluchlosť jednostranná ľahkého a stredného stupňa	1 % - 7 %
51.	Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa	8 % - 12 %
52.	Nahluchlosť obojstranná ľahkého a stredného stupňa	5 % - 20 %
53.	Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa	21 % - 35 %

54.	Strata sluchu jedného ucha	15 %
55.	Strata sluchu oboch uší	40 %
56.	Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	5 % - 20 %
57.	Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	21 % - 50 %

Poškodenie chrupu

58.	Za stratu jedného zuba	1 %
59.	Za stratu každého ďalšieho zuba	1 %
60.	Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba	0,5 %
61.	Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov	do 5 %
62.	Za stratu časti zuba, pokiaľ nemá za následok stratu vitality zuba	0 %
63.	Za stratu mliečného zuba	0 %
64.	Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad	0 %

Poškodenie jazyka

65.	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 65. až 68.	5 % - 15 %
-----	--	------------

Úraz krku

66.	Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa	5 % - 15 %
67.	Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa	16 % - 30 %
68.	Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa	31 % - 65 %
69.	Úplná strata hrtana	80 %
70.	Čiastočná strata hlasu	3 % - 20 %
71.	Strata hlasu (afónia)	25 %
72.	Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov	5 % - 20 %
73.	Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov	30 %
74.	Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	50 %

Úrazy hrudníka, pľúc, srdca a pažeráka

75.	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa, bez prejavov dychovej nedostatočnosti	0,5 % - 10 %
76.	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti	10,5 % - 20 %
77.	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti	20,5 % - 30 %
78.	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné	5 % - 40 %
79.	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné	20 % - 80 %
80.	Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie	20 % - 80 %
81.	Fistula pažeráka po úraze pokiaľ sa nedá riešiť rekonštrukciou	20 % - 40 %
82.	Pouúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	3 % - 10 %
83.	Pouúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa	11 % - 20 %
84.	Pouúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa	21 % - 60 %

Úrazy brucha a tráviacich orgánov

85.	Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	1 % - 20 %
86.	Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy	5 % - 100 %
87.	Strata sleziny - do 18. roku	25 %
88.	Strata sleziny - po 18. roku	15 %
89.	Strata časti sleziny, podľa závažnosti poruchy funkcie	do 15 %
90.	Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí, pokiaľ sa nedá riešiť chirurgicky	20 % - 50 %
91.	Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná	5 % - 20 %
92.	Nedovieravosť análnych zvieračov úplná	30 % - 60 %
93.	Pouúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého alebo stredného stupňa	3 % - 20 %
94.	Pouúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa	21 % - 50 %

Úrazy močových a pohlavných ústrojov

95.	Strata jednej obličky	40 %
96.	Pouúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého a stredného stupňa	5 % - 20 %
97.	Pouúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa	21 % - 50 %
98.	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry (nemožno súčasne hodnotiť podľa 91. a 92.)	10 % - 50 %
99.	Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek	10 % - 50 %
100.	Hydrokéla po úraze	0,5 % - 5 %
101.	Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) do 45 rokov	10 %
102.	Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) nad 45 rokov	5 %
103.	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov	35 %
104.	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 45 rokov	20 %
105.	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov	15 % - 40 %
106.	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 45 rokov	5 % - 20 %
107.	Pouúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov	15 % - 40 %

Úrazy chrbtovej kosti a miechy

108.	Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého stupňa	5 % - 10 %
109.	Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti stredného stupňa	11 % - 20 %
110.	Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ťažkého stupňa	21 % - 35 %
111.	Pouúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého a stredného stupňa	10 % - 40 %
112.	Pouúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa	41 % - 100 %

113.	Pouřazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskeym pozorovaním	1 % - 15 %
------	--	------------

Úrazy panvy

114.	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	10 % - 65 %
115.	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov	5 % - 50 %
116.	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov	5 % - 50 %

Úrazy horných končatín (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)

117.	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vpravo	60 %
118.	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vľavo	50 %
119.	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo	35 %
120.	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo	30 %
121.	Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahanie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo	30 %
122.	Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahanie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo	25 %
123.	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vpravo	0,4 % - 5 %
124.	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vľavo	0,2 % - 4 %
125.	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vpravo	5,5 % - 10 %
126.	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo	4,5 % - 8 %
127.	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie do 90°), vpravo	10,5 % - 18 %
128.	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie do 90°), vľavo	8,5 % - 15 %
129.	Pakľb ramennej kosti, vpravo	40 %
130.	Pakľb ramennej kosti, vľavo	35 %
131.	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vpravo	30 %
132.	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vľavo	25 %
133.	Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo	3 %
134.	Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo	2 %

135.	Nenapravené akromioklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo	6 %
136.	Nenapravené akromioklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo	5 %
137.	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vpravo	3 %
138.	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vľavo	2 %
Poškodenie v oblasti laktového kĺbu a predlaktia (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)		
139.	Úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo	30 %
140.	Úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo	25 %
141.	Úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízke (ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo	20 %
142.	Úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízke (ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo	15 %
143.	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	2 % - 12 %
144.	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	1 % - 10 %
145.	Obmedzenia pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	13 % - 18 %
146.	Obmedzenia pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	11 % - 16 %
147.	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízke (v maximálnej pronácii alebo supinácii v krajnom odvrátení privrátení), vpravo	20 %
148.	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízke (v maximálnej pronácii alebo supinácii v krajnom odvrátení privrátení), vľavo	15 %
149.	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo	1 % - 15 %
150.	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo	1 % - 10 %
151.	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vpravo	0,5 % - 10 %
152.	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vľavo	0,3 % - 8 %
153.	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo	10,5 % - 15 %
154.	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo	8,5 % - 12 %
155.	Pakľb oboch kostí predlaktia, vpravo	40 %
156.	Pakľb oboch kostí predlaktia, vľavo	35 %
157.	Pakľb vretennej kosti, vpravo	25 %
158.	Pakľb vretennej kosti, vľavo	20 %

159.	Pakľb laktovej kosti, vpravo	15 %
160.	Pakľb laktovej kosti, vľavo	10 %
161.	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vpravo	25 %
162.	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vľavo	20 %
163.	Kývavý laktový kľb, vpravo	5 % - 30 %
164.	Kývavý laktový kľb, vľavo	3 % - 25 %
165.	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kľbe, vpravo	55 %
166.	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kľbe, vľavo	45 %

Strata alebo poškodenie ruky (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)

167.	Strata ruky v zápästí, vpravo	50 %
168.	Strata ruky v zápästí, vľavo	45 %
169.	Strata všetkých prstov ruky, vrátane záprstných kostí vpravo	50 %
170.	Strata všetkých prstov ruky, vrátane záprstných kostí vľavo	45 %
171.	Strata prstov ruky okrem palca, vpravo	40 %
172.	Strata prstov ruky okrem palca, vľavo	35 %
173.	Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dľaňové ohnutie ruky), vpravo	30 %
174.	Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dľaňové ohnutie ruky), vľavo	25 %
175.	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vpravo	5 % - 20 %
176.	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vľavo	3 % - 17 %
177.	Pakľb člnkovitej kosti, vpravo	15 %
178.	Pakľb člnkovitej kosti, vľavo	13 %
179.	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vpravo	1 % - 12 %
180.	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vľavo	1 % - 10 %
181.	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo	13 % - 18 %
182.	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo	11 % - 15 %

Poškodenie palca (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)

183.	Strata koncového článku palca, vpravo	9 %
184.	Strata koncového článku palca, vľavo	7 %
185.	Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo	25 %
186.	Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo	20 %
187.	Strata oboch článkov palca, vpravo	18 %
188.	Strata oboch článkov palca, vľavo	15 %

189.	Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo	8 %
190.	Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo	6 %
191.	Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vpravo	7 %
192.	Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vľavo	6 %
193.	Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo	0,4 % - 6 %
194.	Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo	0,3 % - 5 %
195.	Úplná meravosť základného kľbu palca, vpravo	1 % - 6 %
196.	Úplná meravosť základného kľbu palca, vľavo	0,6 % - 5 %
197.	Úplná meravosť karpometakarpálneho kľbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo	9 %
198.	Úplná meravosť karpometakarpálneho kľbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo	7 %
199.	Úplná meravosť karpometakarpálneho kľbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo	1 % - 6 %
200.	Úplná meravosť karpometakarpálneho kľbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo	0,6 % - 5 %
201.	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo	3 %
202.	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo	2 %
203.	Úplná meravosť všetkých kľbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo	20 %
204.	Úplná meravosť všetkých kľbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo	18 %
205.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kľbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	0,3 % - 4 %
206.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kľbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	0,2 % - 3 %
207.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kľbu ťažkého stupňa, vpravo	4,5 % - 6 %
208.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kľbu ťažkého stupňa, vľavo	3,5 % - 5 %
209.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kľbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	0,2 % - 4 %
210.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kľbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	0,1 % - 3 %
211.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kľbu ťažkého stupňa, vpravo	4,5 % - 6 %
212.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kľbu ťažkého stupňa, vľavo	3,5 % - 5 %

213.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	1 % - 6 %
214.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	0,6 % - 5 %
215.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	6,5 % - 9 %
216.	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	5,5 % - 7 %

Poškodenie ukazováka (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)

217.	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	4 %
218.	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	3 %
219.	Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo	8 %
220.	Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo	6 %
221.	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	12 %
222.	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	10 %
223.	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo	15 %
224.	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo	12 %
225.	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo	10 %
226.	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo	8 %
227.	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo	12 %
228.	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo	10 %
229.	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	0,2 % - 4 %
230.	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	0,1 % - 3 %
231.	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	4,5 % - 8 %
232.	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	3,5 % - 6 %
233.	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo	8,5 % - 10 %
234.	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vľavo	6,5 % - 8 %
235.	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	2 %
236.	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	1 %
237.	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo	3 %
238.	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo	2 %

Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)

239.	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo	9 %
------	---	-----

240.	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo	7 %
241.	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo	9 %
242.	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo	7 %
243.	Strata dvoch článkov prsta, vpravo	5 %
244.	Strata dvoch článkov prsta, vľavo	4 %
245.	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	3 %
246.	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	2 %
247.	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo	8 %
248.	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo	6 %
249.	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	0,1 % - 2 %
250.	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	0,1 % - 1 %
251.	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	2,5 % - 5 %
252.	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	1,5 % - 4 %
253.	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo	5,5 % - 6 %
254.	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vľavo	4,5 % - 5 %
255.	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	2 %
256.	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	1 %
257.	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo	2 %
258.	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo	1 %

Traumatické poškodenia nervov hornej končatiny

259.	Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vpravo	10 % - 60 %
260.	Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vľavo	8 % - 50 %
261.	Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vpravo	5 % - 30 %
262.	Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vľavo	4 % - 25 %
263.	Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vpravo	5 % - 40 %
264.	Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vľavo	3 % - 30 %
265.	Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vpravo	5 % - 25 %
266.	Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vľavo	4 % - 20 %
267.	Izolovaná porucha (lézia) nervus cutaneus brachii radialis bez motorického deficitu	1 % - 10 %
268.	Izolovaná porucha (lézia) stredového nervu, vľavo (nervus medianus)	0,5 % - 5 %
269.	Izolovaná porucha (lézia) stredového nervu, vpravo (nervus medianus)	5 % - 10 %

270.	Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vpravo	2 % - 15 %
271.	Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vľavo	1 % - 10 %
272.	Porucha (lézia) nervus ulnaris, vpravo	5 % - 40 %
273.	Porucha (lézia) nervus ulnaris, vľavo	3 % - 30 %
274.	Porucha (lézia) nervus ulnaris len senzitivnej časti	0,5 % - 10 %
275.	Traumatická porucha stredového nervu, vpravo (nervus medianus)	5 % - 25 %
276.	Traumatická porucha stredového nervu, vľavo (nervus medianus)	4 % - 20 %
277.	Porucha nervus musculocutaneus, vpravo	3 % - 20 %
278.	Porucha nervus musculocutaneus, vľavo	2 % - 15 %
279.	Porucha nervus musculocutaneus len senzitivnej časti	0,5 % - 7 %
280.	Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vpravo	12 % - 40 %
281.	Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vľavo	10 % - 30 %
282.	Lézia distálnej časti nervus radialis oblasť ruky, vpravo	5 % - 25 %
283.	Lézia distálnej časti nervus radialis oblasť ruky, vľavo	4 % - 20 %
284.	Izolovaná porucha (lézia) citlivosti nervus radialis	0,5 % - 7 %

Úrazy dolných končatín

285.	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50 %
286.	Pakľb stehnovej kosti v krčku alebo nekroza hlavice	40 %
287.	Čiastočná endoprotéza bedrového kĺbu + možné hodnotiť pohyblivosť kĺbu, spolu však nesmie presiahnuť % plnenia za TEP	8 %
288.	Totálna endoprotéza (TEP) bedrového kĺbu	15 %
289.	Aktívny chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.	25 %
290.	Skrátenie dolnej končatiny od 1 cm do 4 cm	do 5 %
291.	Skrátenie dolnej končatiny do 6 cm	5,5 % - 10 %
292.	Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm	10,5 % - 20 %
293.	Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	40 %
294.	Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	5 % - 30 %
295.	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého a stredného stupňa	3 % - 15 %
296.	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa	16 % - 25 %

Poškodenie kolena

297.	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)	10 % - 30 %
298.	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)	31 % - 40 %
299.	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení	5 % - 25 %
300.	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého a stredného stupňa	3 % - 15 %

301.	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	16 % - 25 %
302.	Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa	3 % - 10 %
303.	Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa	11 % - 20 %
304.	Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, za ktorý sa nepovažuje nákolienica	21 % - 30 %
305.	Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. hodnotiť.	5 %
306.	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. hodnotiť.	10 %

Poškodenie predkolenia

307.	Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom	45 %
308.	Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom	50 %
309.	Pakľb pŕšťaly alebo oboch kostí predkolenia	45 %
310.	Aktívny chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach a po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.	20 %

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu

311.	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40 %
312.	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka	30 %
313.	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
314.	Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)	6 % - 30 %
315.	Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení, alebo jemu blízkom	5 % - 25 %
316.	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa	2 % - 12 %
317.	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	13 % - 20 %
318.	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	2 % - 12 %
319.	Kývavosť členkového kĺbu	2 % - 12 %
320.	Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné pouřazové deformity v oblasti členka a nohy	5 % - 25 %
321.	Aktívny chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.	3 % - 15 %

Poškodenie v oblasti nohy

322.	Strata všetkých prstov nohy	18 %
323.	Strata oboch článkov palca nohy	10 %
324.	Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	15 %
325.	Strata koncového článku palca nohy	3 %

326.	Strata iného prsta nohy, za každý prst	2 %
327.	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
328.	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
329.	Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy	5 %
330.	Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy	8 %
331.	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	0,2 % - 3 %
332.	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	0,5 % - 5 %
333.	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst	0,2 % - 2 %
334.	Pouúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	1 % - 10 %
335.	Pouúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	5 % - 20 %
336.	Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne nad 2 cm v objeme	3,1 % - 5 %
337.	Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne nad 1 cm v objeme	0,1 % - 3 %
338.	Porucha (lézie) nervus glutei sup. a interior	3 % - 15 %
339.	Porucha nervus obturatorius	3 % - 15 %
340.	Senzitívna lézia nervus obturatorius	1 % - 7 %
341.	Pouúrazová porucha nervus femoralis	5 % - 30 %
342.	Senzitívna lézia stehenného nervu	1 % - 10 %
343.	Pouúrazová porucha nervus ischiadicus (sedací nerv)	10 % - 40 %
344.	Senzitívna lézia nervus ischiadicus	3 % - 15 %
345.	Nervus tibialis úplná porucha	10 % - 30 %
346.	Nervus tibialis distálnej časti s poruchou hybnosti prstov nohy	0,5 % - 5 %
347.	Senzitívna porucha nervus tibialis	0,3 % - 5 %
348.	Porucha kmeňa nervus fibularis s postihnutím všetkých inervovaných svalov	10 % - 30 %
349.	Lézia hĺbkovej vetvy ihlicového nervu	4 % - 20 %
350.	Lézia povrchovej vetvy ihlicového nervu (len senzitívnej časti)	1 % - 10 %

Jazvy

351.	Rozsiahle plošné jazvy od 1 % do 15 % telesného povrchu, okrem tváre	0,5 % - 10 %
352.	Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % telesného povrchu	10,5 % - 40 %
353.	Zvlášť zohyzďujúce jazvy od 2 cm na exponovaných častiach tela pokiaľ nedosahujú 1 % telesného povrchu, exponované časti: krk, dekolť, predlaktia v rámci laktá, ruky, predkolenia v rámci kolena, dorsum nohy. Jazvy na tvári sa hodnotia podľa bodu 8.	0,1 % - 3 %
354.	Jazva, ktorá vznikla ako následok operácie vykonanej z akéhokoľvek dôvodu	0 %
355.	Jazva, pokiaľ nie je na exponovanej časti tela a nedosahuje 1 % telesného povrchu	0 %
356.	Jazva, pokiaľ je na exponovanej časti tela a nedosahuje 2 cm	0 %
357.	Pouúrazové zmeny pigmentácie	0 %

Iné

358.	Pouúrazové bolesti bez funkčného poškodenia	0 %
359.	Pouúrazové degeneratívne zmeny	0 %
360.	Pouúrazové poruchy citlivosti bez poškodenia nervu	0 %

Platné od 01. 07. 2025